โรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ



สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัสเอฟเอ็มดี (FMD) การติดต่อเกิดจากการสัมผัสกันระหว่างสัตว์ป่วยกับสัตว์ปกติ หรืออาจติดต่อกันโดยการกินอาหารและน้ำที่มีเชื้อไวรัสนี้ปะปน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์ บุคคล ยานพาหนะ

อาการของโรค

มีไข้ ซึม ไม่กินอาหาร เดินขากะเผลก
มีเม็ดตุ่มพองบริเวณริมฝีปากและในช่องปาก

การรักษา

เมื่อสัตว์ป่วยโรคนี้ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที เพราะโรคนี้ไม่มียารักษา ถ้าเป็นแล้วต้องใช้ยาบำรุง, ยาปฏิชีวนะป้องกันโรคแทรกซ้อน

การป้องกัน

1. ฉีดวัคซีนครั้งแรกตั้งแต่อายุ 4-6 เดือน
2. ฉีดครั้งที่ 2 หลังฉีดครั้งแรก 3-4 สัปดาห์
3. ในกรณีที่เกิดโรคระบาดให้ฉีดวัคซีนซ้ำทันทีทุกตัว







กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร. 0 4360 2121